

羧甲司坦口服溶液说明书

请仔细阅读说明书并按说明书使用或在药师指导下购买和使用



【药品名称】

通用名称：羧甲司坦口服溶液

英文名称：Carbocysteine Oral Solution


汉语拼音：Suojiasitan Koufurongye

【成份】

本品每 125 毫升含羧甲司坦 6.25 克。辅料为：蔗糖、焦糖、羟苯甲酯、肉桂油、乙醇、氢氧化钠、草莓香精、纯化水。

化学名称：S-(羧甲基)半胱氨酸

化学结构式：



分子式：C₅H₉NO₄S

分子量：179.19

【性状】

本品为黄色至棕黄色澄清溶液，有草莓香气。

【作用类别】

本品为祛痰类非处方药药品。

【适应症】

用于治疗慢性支气管炎等疾病引起的痰液粘稠、咳痰困难患者。

【规格】

125 毫升：6.25 克

【用法用量】

口服。

2～5 岁儿童：一次 2 毫升，一日 4 次；

5～12 岁儿童：一次 4 毫升，一日 3 次。

使用说明：


本品包装为 1 瓶 / 盒，每盒中均各配备 1 个口服给药器以及瓶塞，瓶塞中心带有小孔，用于插入口服给药器。

将瓶塞安装到新开药瓶中




1. 用力向下按并逆时针转动取下瓶盖(如瓶盖顶部所示)。
2. 将打开的瓶子竖直放在桌子上，将瓶塞用力按入瓶口，直到按不动为止。
注：您可能无法完全向下按动瓶塞，没有关系，因为当您重新拧上瓶盖时，它会被强行按入瓶子。
3. 把瓶盖拧回瓶子上。

准备用药所需剂量




4. 用力向下按并逆时针转动取下瓶盖(如盖顶部所示)。
5. 检查推杆是否完全推至口服给药器尽头。
6. 保持瓶子直立，将口服给药器牢固地插入瓶塞。




7. 将口服给药器固定到位，小心地将瓶子和口服给药器倒置。
 8. 在您量取所需剂量之前，您需要排除口服给药器中大气泡。
- 操作方法：
- 慢慢地将推杆外拉，使药物充满口服给药器。
 - 然后，将推杆推回原位，使其再次变空。

量取所需剂量



9. 在口服给药器上找到与所需药物量相对应的刻度。
10. 缓慢地拉推杆，直到所示环的上边缘与刻度完全齐平。



11. 小心地将瓶子和口服给药器直立。
12. 轻轻拧出口服给药器，将其从瓶塞上取下。

服药



13. 患者坐直。
14. 将口服给药器的末端放入患者口中。
15. 慢慢地推动推杆，直接喝下药物。
16. 使用后不用取下瓶塞，需重新盖好瓶盖，注意务必将瓶盖拧紧。
17. 清洁口服给药注射器：
• 每次使用口服给药器后用温水清洗，并让其干燥，存放在儿童看不到和接触不到的地方。

【不良反应】可见恶心、胃部不适、腹泻、轻度头痛以及皮疹等。

【禁忌】消化道溃疡活动期患者禁用。

【注意事项】

1. 服药 7 日后，如症状未缓解，应立即就医。
2. 有消化道溃疡史者慎用。
3. 孕妇、哺乳期妇女慎用。
4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
5. 本品性状发生改变时禁止使用。
6. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
7. 儿童必须在成人监护下使用。
8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】

1. 应避免同时服用强镇咳药，以免痰液堵塞气道。
2. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】

本品为粘液调节剂，主要作用于支气管腺体的分泌，使低粘度的唾液粘蛋白分泌增加，高粘度的岩藻粘蛋白产生减少，因而使痰液的粘稠性降低而易于咳出。

【贮藏】

遮光，密封，不超过 20℃ 保存。

【包装】

采用钠钙玻璃模制药瓶和药用聚丙烯压旋盖(含垫片)包装。配有聚乙烯口服给药器以及口服药用低密度聚乙烯瓶塞。1 瓶 / 盒。

【有效期】

24 个月。

本品开启后使用期限为 15 天。

【执行标准】

YBH06592022

【批准文号】

国药准字 H20223415

【说明书修订日期】

2022 年 08 月 18 日

【药品上市许可持有人】

企业名称：广州一品红制药有限公司
注册地址：广州市经济技术开发区东区东博路 6 号
邮政编码：510760
联系方式：020-28877666
传真号码：020-28877668
服务热线：400-1833-668
网 址：www.gdyph.com

【生产企业】

企业名称：广州一品红制药有限公司
生产地址：广州市经济技术开发区东区东博路 6 号
邮政编码：510760
联系方式：020-28877666
传真号码：020-28877668
服务热线：400-1833-668
网 址：www.gdyph.com

如有问题可与生产企业联系