核准日期：2006年10月26日
修改日期：2021年08月31日

一品红®

注射用曲克芦丁说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】
通用名称： 注射用曲克芦丁
英文名称： Troxerutin for Injection
汉语拼音： Zhusheyong Qukeluding
【成　　份】 本品主要成份为曲克芦丁。
化学名称： 7,3’,4’-三羟乙基芦丁。
化学结构式：

分子式： $C_{33}H_{42}O_{19}$
分子量： 742.69
辅　　料： 甘露醇
【性　　状】 本品为浅黄色至黄色疏松块状物或粉末。
【适应症】 用于缺血性脑血管病（如脑血栓形成、脑栓塞）、中心性视网膜炎、动脉硬化、血栓性静脉炎、静脉曲张、血管通透性增高所致水肿等。
【规　　格】 (1) 0.32g (2)0.48g
【用法用量】 静脉滴注。一次240～480mg，一日1次。(用5～10%葡萄糖注射液或低分子右旋糖酐注射液稀释后静注)，20天为1疗程或遵医嘱。
【不良反应】 偶见过敏反应，潮红、头痛及胃肠道不适等。曾有患者静注本品出现急性脑水肿、心律失常及肝脏毒性反应的报道。
【禁　　忌】 对本品任何成份过敏者禁用。
【注意事项】 1.用药期间避免阳光直射、高温及过久站立。
2.本品使用前请仔细检查，如有溶液浑浊，封口松动，瓶身裂纹者，请勿使用。
【孕妇及哺乳期妇女用药】尚不明确
【儿童用药】 尚缺乏本品儿童用药的研究和文献资料不推荐儿童使用本品。
【老年用药】 尚缺乏本品老年患者使用本品的研究资料。老年患者使用本品可参考【用法用量】和其它项下内容或遵医嘱。
【药物相互作用】尚不明确。
【药物过量】 尚无本品药物过量的研究资料，一旦发生过量，应立即停药就医。予以对症和支持治疗。
【药理毒理】 曲克芦丁能抑制血小板的聚集，有防止血栓形成的作用。同时能对抗-羟色胺，缓激肽引起的血管损伤，增加毛细血管抵抗力，降低毛细血管通透性，可防止血管通透性升高引起的水肿。
【药代动力学】 血浆蛋白结合率为30%左右，消除相半衰期（$t_{1/2\beta}$）10～25小时，可能存在肠肝循环，代谢产物70%随粪便排除体外。
【贮　　藏】 遮光，密闭，在阴凉处保存（不超过20°C）。
【包　　装】 (1) 管制抗生素玻璃瓶，每盒10瓶
(2) 管制抗生素玻璃瓶，每盒5瓶，配5支一次性使用预充注射式溶药器（带针）规格：5ml
【有效期】 18个月
【执行标准】 国家食品药品监督管理总局 国家药品标准 WS_1-XG-028-2014
【批准文号】 国药准字H20041040（0.32g）
国药准字H20041041（0.48g）
【药品上市许可持有人】
企业名称： 广州一品红制药有限公司
注册地址： 广州市经济技术开发区东区东博路6号
邮政编码： 510760
联系方式： 020-28877666
传　　真： 020-28877668
服务热线： 400-1833-668
网　　址： www.gdyph.com
【生产企业】
企业名称： 广州一品红制药有限公司
生产地址： 广州市经济技术开发区东区东博路6号
邮政编码： 510760
联系方式： 020-28877666
传　　真： 020-28877668
服务热线： 400-1833-668
网　　址： www.gdyph.com