

注射用长春西汀说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称：注射用长春西汀

商品名称：宁绪欣


英文名称：Vinpocetine for Injection

汉语拼音：Zhushheyong Changchunxiting

【成份】本品主要成份为长春西汀。

化学名称：乙基(13a,13bs)—13a—乙基—2,3,5,6—13a,13b六氢—1H—吲哚[3,2,1—de]吡啶[3,2,1—ij][1,5]—二氮杂萘—12—羧酸酯

化学结构式：



分子式：C₂₂H₂₆N₂O₂

分子量：350.46

辅料：甘露醇，枸橼酸

【性状】本品为白色或类白色疏松块状物或粉末。

【适应症】改善脑梗塞后遗症、脑出血后遗症、脑动脉硬化症等诱发的各种症状。

【规格】(1) 10mg (2) 20mg (3) 30mg

【用法用量】静脉滴注，开始剂量每天20mg，加入到适量的5%葡萄糖或0.9%氯化钠注射液缓慢滴注，以后可根据病情增加至每天30mg，或遵医嘱。

【不良反应】1. 过敏症：有时可出现皮疹，偶有荨麻疹、瘙痒等过敏症状，若出现此症状应停药。
2. 精神神经系统：有时头疼、眩晕、偶尔出现困倦感，侧肢的麻木感，脱力感加重。
3. 消化道：有时恶心、呕吐、也偶尔出现食欲不振、腹痛、腹泻等症状。
4. 循环器官：有时可出现颜面潮红，头昏等症状，偶见低血压、心动过速等。
5. 血液：有时可出现白细胞减少。
6. 肝脏：有时可出现转氨酶升高，偶尔也出现碱性磷酸升高和黄疸等。
7. 肾脏：偶尔可出现血尿素氮升高。

【禁忌】1. 对本品过敏者禁用；
2. 颅内出血急性期者禁用；
3. 严重缺血性心脏病、严重心律失常者禁用。

【注意事项】1. 本品应在医生指导下使用。
2. 出现过敏症状时，应立即停药就医。
3. 长期使用应注意血象变化。
4. 本品不可以静脉或肌肉推注。

【孕妇及哺乳期妇女用药】1. 孕妇或已有妊娠可能的妇女禁用；

2. 哺乳期妇女应避免使用本品，如不得不使用，应停止哺乳。

【儿童用药】尚缺乏本品儿童用药的安全性和有效性的研究。

【老年用药】请参照[用法用量]或遵医嘱。

【药物相互作用】本品不得与肝素合并使用。

【药物过量】尚缺乏本品过量的研究资料和报道。一旦过量，应立即停药，予以对症和支持治疗。

【药理毒理】本品为脑血管扩张药，能抑制磷酸二酯酶活性，增加血管平滑肌松弛信使C-GMP的作用，选择性地增加脑血流量，此外还能抑制血小板凝集，降低人体血液粘度，增强红细胞变形力，改善血液流动性和微循环，促进脑组织摄取葡萄糖，增加脑耗氧量，改善脑代谢。

【药代动力学】本品体内分布广泛，自血浆消除较快，可通过血脑屏障进入脑组织，脑脊液中浓度为血浓度的1/30，可进入胎盘。与人血浆蛋白结合率为66%。肝脏主要代谢产物为阿朴长春胺酸，由肾脏排泄，其药理作用与原形药相似，但药效较低。本品在体内无蓄积倾向。

【贮藏】遮光，密闭，在阴凉处保存(不超过20℃)。

【包装】(1) 管制抗生素玻璃瓶，每盒1瓶，每盒2瓶，每盒10瓶。
(2) 管制抗生素玻璃瓶，每盒1瓶，配1瓶灭菌注射用水(专用溶媒)+1枚一次性使用免推注式无菌溶药移液器[免推注式专用溶媒型]。
(3) 管制抗生素玻璃瓶，每盒6瓶，配6支一次性使用预充注射式溶药器(带针)规格：5ml

【有效期】24个月。

【执行标准】国家食品药品监督管理局 国家药品标准YBH03772008

【批准文号】(1) 国药准字H20041689(10mg)
(2) 国药准字H20080180(20mg)
(3) 国药准字H20080181(30mg)

【药品上市许可持有人】

企业名称：一品红生物医药有限公司

注册地址：广州市黄埔区东区东博路6号自编一栋自编101房

邮政编码：510760

联系方式：020-28877666

传真：020-28877668

服务热线：400-1833-668

网址：www.gdyph.com

【生产企业】

企业名称：广州一品红制药有限公司

生产地址：广州市经济技术开发区东区东博路6号

邮政编码：510760

联系方式：020-28877666

传真：020-28877668

服务热线：400-1833-668

网址：www.gdyph.com

